

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 5	Antal sidor 1
Dokumentägare Elisabeth Skalare Levein Smittskyddssjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2022-02-16	Giltig t.o.m. 2024-02-16

Mykoplasmapneumoni

Gäller för: Hälso- och sjukvård



Tillämpa basala hygienrutiner

Sjukdom

Mykoplasmapneumoni orsakas av bakterien *Mycoplasma pneumoniae* som kan ge luftrörskatarr och ibland lunginflammation. Sjukdomsförloppet vid mykoplasmapneumoni är långsamt. Heshet kan vara ett tidigt symtom. Hostan är ofta torr, retande och kan hålla på i ett par veckor. Huvudvärk och låggradig feber är vanligt.

Smittvägar

Smitta sker från person till person genom kontaktsmitta och droppsmitta.

Smittsamhet

Smittsamheten är stor vid tät kontakt. Större utbrott kan inträffa i slutna enheter som t.ex. militärförläggningar. Smittspridningen är också stor inom familjen. Vanligt är att flera familjemedlemmar insjuknar efter varandra med någon eller några veckors mellanrum. Mykoplasmapneumoni har en inkubationstid på 2–3 veckor.

Placering

Patient med mykoplasmapneumoni ska vårdas på enkelrum med egen toalett och stängd dörr och ska inte vistas i gemensamhetslokaler. Uppmana patienten att desinfektera händerna innan måltid och efter toalettbesök. Instruera patienten att vid hosta alltid täcka munnen med engångsnäsdukar och därefter slänga näsduken i plastpåse.

Personal

Smittsamhet till personal är liten vid tillämpning av basala hygienrutiner.

Disk

Hanteras som vanligt disk.

Tvätt

Hanteras som vanlig tvätt.

Avfall

Hanteras som vanligt avfall.

Städning

Daglig städning och slutstädning; rengöringsmedel och vatten.

[Mer information om mykoplasmapneumoni på Smittskydd Värmlands webbplats](#)

Dokumentet är utarbetat av: Elisabeth Skalare Levein