

Provtagningsmall STI

Besvär

STI	Klamydia	Gonorré	Mycoplasma G	Hepatit B	Hepatit C	Hiv	Syfilis	Kondylom	Herpes	Kommentar
Tidigaste tid för provtagning efter smittotillfälle. (Tidigare om symtom.)	7 dagar	7 dagar	7 dagar	2 + 6 månader	2 + 6 månader	2 + 6 veckor (12 v * vid misstanke om hiv 2)	2 veckor + 6 månader			* Hiv 2 förekommer framför allt i Västafrika, Portugal och Frankrike
Har/har haft urinvägsbesvär	●	●	●							Ev. urinodling
Har/har haft flytningar	●	●	●							
Har/har haft mellanblödningar	●		●							
Har/har haft blödning i samband med samlag	●		●					!		Om STI uteslutits som orsak, undersökning av läkare för uteslutande av malignitet
Smärta nedtill i buken/underlivet	●	●	◐							Undersökning av läkare
Sår, utslag, blåsor, klåda eller smärta i underlivet	●						◐	!	●	Ev. undersökning av läkare (syfilissår kan också förekomma oralt)
Svullna lymfkörtlar	●	◐				●			◐	Ev. undersökning av läkare
Ögonbesvär/ensidig konjunktivit	●	◐								Prov tas från konjunktiva, ev. till ögonläkare
Halsbesvär efter oralsex	○	◐								Ta svalgprov klamydia/gonorré vid halsbesvär efter oskyddat oralsex
Anala besvär och/eller proktit	●	●	●	●	●	●	●	!	!	Vid positiv klamydia analt och anala besvär, tänk LGV (Lymfogranuloma venerum). Kontakta STI-mott, CSK.
Har haft sex utomlands	●	●	!	●	●	●	●	!		Sjukdomar har olika prevalens i olika länder
Smittskyddsslag = - smittspårning - anmälningskyldighet - förhållningsregler	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Om ja, undersökning och behandling gratis för patienten
Handläggning	Partnerbehandling efter provtagning. Svar behöver inte inväntas.	Vid positivt prov direktkontakt med STI-mott, CSK. Behandling och övrig handläggning görs av STI-mott.	Aktuell(a) partner provtas och behandlas enligt provsvar	Vid positivt prov remiss till infektionskliniken, CSK	Vid positivt prov remiss till infektionskliniken, CSK	Vid positivt prov direktkontakt med infektionskliniken, CSK (telefon)	Vid positivt prov remiss till STI-mott, CSK			
Rekommenderad behandling	Doxycyklin Se riktlinjen Sexuellt överförbara infektioner	Handläggs på STI-mott, CSK	Azitromycin Obs! 5-dagars-behandling. Se riktlinjen Sexuellt överförbara infektioner	Handläggs på infektionskliniken, CSK	Handläggs på infektionskliniken, CSK	Handläggs på infektionskliniken, CSK	Handläggs på STI-mott, CSK	Behandling, se riktlinjen Sexuellt överförbara infektioner	Behandling, se riktlinjen Sexuellt överförbara infektioner	Vid graviditet och infektion, se riktlinjen Sexuellt överförbara infektioner och www.medscinet.se/infpreg .
Annat	Kontrollprov efter beh. är i normalfallet ej nödvändigt. Risk för falskt positivt svar.		Prov ska inte tas som screening. Vid symtom ta prov samtidigt som klamydia.			Pat har rätt till anonymt hiv-test. Vid positivt test upphör rätten att vara anonym.		Tänk på annan STI.	För symtomlindring: Behandling helst inom 72 timmar och alltid vid utveckling av nya blåsor oavsett tid från symtomdebut. Tänk på annan STI. Vid primär herpes kan ibland svullna lymfkörtlar förekomma.	

Angelägenhetsgrad för provtagning

● = Hög

◐ = Medel, överväg provtagning efter noggrann anamnes

○ = Låg (inte 0)

! = Tänk på