

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Kirurgi Arvika och Karlstad	Version 2	Antal sidor 1
Dokumentägare Katrín Edlund Sjuksköterska	Fastställare Per Swanholm Bitr. sektionschef urologsektionen	Giltig fr.o.m. 2020-05-11	Giltig t.o.m. 2022-05-31

Suprapubiskateter

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Suprapubisk urinkateter är en kvarliggande kateter som läggs in i urinblåsan genom bukväggen och kan användas av både män och kvinnor. Denna kateterbehandling har flera fördelar jämfört med kateter via urinröret. Den kan användas såväl kortare tid som permanent.

Läggs in av kirurg/urolog. Första bytet brukar oftast göras efter 6-8 veckor (gärna 8 veckor), ordineras oftast av operatören. Detta sker på sjukhus och bör utföras av van personal (läkare, uroterapeut eller sjuksköterska). Vanligtvis används kateter med hydrogelbelagd latex eller helsilikon.

Hur ofta den ska bytas beror på den enskilde patientens behov. Bedömningen grundas på risken för stenutfällning på kateter och i urin och eventuellt obehag för patienten. Följ annars tillverkarens anvisning. Den ska också bytas vid antibiotikabehandling vid urinvägsinfektion.

Huden runt insticksstället bör dagligen tvättas med tvål och ljummet vatten. Behöver endast bandageras om sekret bildas.

Om suprapubiskatetern faller ut ska en ny omedelbart sättas in, då det tar endast 15–20 minuter innan kanalen sluter sig och det kan bli svårt att lägga in en ny. Tappningskateter kan tillfälligt användas, men patienter med suprapubiskateter bör ha en extra KAD hemma.

Referenser

[Vårdhandboken/Handbok för hälso och sjukvård. Avsnitt: Kateterisering av urinblåsa.](http://www.varldhandboken.se/)
www.varldhandboken.se/

Dokumentet är utarbetat av: Katrin Edlund , Kvalitetsrådet Förebygga VUVI och Petter Granlund, sektionschef för urologi