

Restriktioner borttagna för akutproduktion av dospåsar

Apotekstjänst har glädjande nog meddelat att det åter har normala produktionsförhållanden och att tidigare restriktioner kring beställning av akutproduktion nu är lyfta. Tack för ert bidrag. Det har gjort att leveranserna har fungerat och att en mycket besvärlig situation har kunnat undvikas.

Kritik mot blodtrycksstudie ändrar läkemedelskommitténs rekommendation

Studien *“Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial”* publicerad i den ansedda medicinska tidskriften *European heart journal* i juni 2019 låg till grund för en rekommendation från Läkemedelskommittén i Värmland att använda blodtrycksmedicin kvällstid. Det till följd av de ganska dramatiska resultat i positiv riktning, en närmast halverad risk för hjärt-kärlsjukdom som denna studie visade. [Hygia-studien i European Heart Journal](#) fick mycket uppmärksamhet över stora delar av världen i oktober 2019 eftersom effekten av att ta läkemedel på kvällen var slående samtidigt som åtgärden var enkel och kostnadsfri. Vi uppmärksammade studien i ett nyhetsbrev i fjol.

Studiens resultat gjorde att man tittade närmare på metoderna. I december 2019 kom en [medicinsk kommentar i Läkartidningen](#) som rekommenderade att fler resultat bör inväntas innan man ska ändra praxis eftersom studien har metodologiska problem. En grupp internationella ämnesexperter har nu granskat studien och bakgrundsmaterialet. I en [artikel](#) konkluderar experterna entydigt att resultaten inte går att lita på. De avråder till och med från rutinmässig dosering på kvällen på grund av möjligen ökad risk för negativa konsekvenser, särskilt för äldre. En [nyligen publicerad artikel i European Heart Journal](#) ifrågasätter också metoderna som använts. Originalartikeln har nu märkts med en [varning](#) om att resultaten bör tolkas med försiktighet.

Mot bakgrund av nya fakta backar nu läkemedelskommittén på tidigare rekommendation om att blodtrycksmedicin i första hand ska användas kvällstid och rekommenderar att man återgår till tidigare rutiner för blodtrycksbehandling.

Rapportera alla misstänkta biverkningar med koppling till covid-19

Kunskapen om det nya viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19 är fortfarande mycket begränsad, liksom vilka biverkningar och interaktioner med läkemedel som kan uppstå vid misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta. Läkemedelsverket uppmanar därför till att alla misstänkta läkemedelsbiverkningar som uppstår hos en misstänkt smittad eller konstaterat smittad patient rapporteras in till Läkemedelsverket.

Inrapportering av misstänkta läkemedelsbiverkningar skall göras både för läkemedel som används specifikt för behandling av covid-19 samt övriga läkemedel som patienten använder. Eftersom covid-19 är en helt ny sjukdom är det viktigt att samla in kunskap om hur läkemedelsbehandlingar kan påverkas av sjukdomen. Patienter som upplever misstänkta biverkningar av läkemedelsbehandling under covid-19-infektion uppmanas att kontakta sjukvården och även själva rapportera in dessa till Läkemedelsverket. Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera alla misstänkta biverkningar direkt till Läkemedelsverket via deras [e-tjänst](#).