

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Områdesledning öppenvård	Version 5	Antal sidor 2
Dokumentägare Eric Le Brasseur Utvecklingsledare Medicinskt ledningsansvarig Regional vaccinationsenhet covid-19	Fastställare Madelene Johanson Chef Område öppenvård	Giltig fr.o.m. 2021-11-12	Giltig t.o.m. 2023-11-12

Vaccination av gravida mot covid-19 och säsongsinfluensa

Gäller för: Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd, Regional vaccinationsenhet covid-19

Vaccination mot covid-19

Alla gravida rekommenderas vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19 efter graviditetsvecka 12.

För personer som är 30 år eller yngre är endast *Comirnaty* (Pfizer/BioNTech) godkänt.

Tidsbokning sker via nätet eller telefonbokning. Vid bokning samt på vaccinationsmottagning säkerställs att vaccinationen sker efter graviditetsvecka 12.

Gravida som påbörjat vaccination innan graviditeten, eller innan graviditeten blev känd, kan vaccineras med dos 2 med rekommenderat tidsintervall även om dos 2 infaller under första trimestern.

Gravida i riskgrupp för covid-19

Gravida efter graviditetsvecka 12 med riskfaktorer som innebär en högre risk för svårare covid-19, prioriteras för vaccination. Detta gäller gravida som

- tillhör en specificerad riskgrupp *eller*
- är över 35 år *eller*
- har BMI > 30 vid inskrivning på mödrahälsovården

Gravida i riskgrupp kan boka tid för vaccination via 1177.se förutsatt att bokningsbar tid finns i närtid, annars kontaktas telefonservice.

Vaccination mot covid-19 av gravida under första trimestern

Ställningstagande till vaccination före graviditetsvecka 12 sker av läkare på specialistmödravården, som skriver remiss till Regional vaccinationsenhet. Remissmallen *Vaccination mot covid-19* ska användas, val *Vaccination mot covid-19 under graviditet*.

Vaccination mot säsongsinfluensa

Gravida har förhöjd risk för att bli svårt sjuka om de får influensa. Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 16 under influensasäsong.

Gravida i riskgrupp

För gravida som tillhör en medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination innan vecka 16. Detta gäller gravida som har:

- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom
- tillstånd som försämrar lungfunktion eller hostkraft
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes
- immunosuppression

Om samtidig vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa

Vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 kan ges samtidigt till vuxna gravida. Om ett intervall önskas eller efterfrågas ges vaccinen med 7 dagars intervall.

Dokumentet är utarbetat av: Eric Le Brasseur