


Pneumokockvaccination av vuxna (≥ 18 år)



Upprepad vaccination med Prevenar20 rekommenderas inte, men det kan vara aktuellt att ge Pneumovax enligt schemat ovan.

Det saknas information om behovet av revaccination med Prevenar20.

Ökad risk

- Personer som är 65 år eller äldre
- Tillstånd med nedsatt lungfunktion, hostkraft, sekretstagnation
- Kronisk hjärtsjukdom, lungsjukdom, leversjukdom, njursvikt
- Diabetes mellitus
- Personer som har haft invasiv pneumokocksjukdom
- Efter individuell bedömning: Personer med alkohol- eller narkotikamissbruk, rökare, svetsare som utsätts för toxisk rök

Mycket hög risk

- Nedsatt immunförsvaret på grund av sjukdom eller behandling, t.ex. stamcells- eller organtransplantation, hematologisk cancersjukdom, lungcancer, cytostatikabehandling eller kraftig immunosupprimerande läkemedelsbehandling
- Nefrotiskt syndrom
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros

Särskilt hög risk

- Anatomisk eller funktionell aspleni/hypospleni
- Likvorläckage
- Gravt nedsatt immunförsvaret (efter individuell bedömning)