

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 2	Antal sidor 2
Dokumentägare Maria Jonsson Hygiensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2022-08-22	Giltig t.o.m. 2024-08-21

Hygienrutiner vid vaccinationer enligt löpandebandprincipen

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Mottagande

- Optimera patientflöden utifrån lokalens utformning. Om möjligt separat in- och utgång.
- Säkerställ att ingen kommer in i lokalen som har luftvägssymtom.
- Möjliggör handdesinfektion för patienter, vårdar och personal på strategiska ställen som vid in- och utgång, arbetsstationer och utrymmen där vaccination utförs.
- Erbjud munskydd till patienterna.

Avstånd

- Dörrvårdar/administratörer/vaccinatörer ska bära munskydd IIR när inte två meters avstånd kan hållas till patienterna.
- Personal ska använda munskydd om inte två meters avstånd till annan personal kan hållas.
- Tänk på att hålla två meters avstånd i personalutrymmen/köksdel. Fördela raster så trängsel undviks.

Kläder

- Arbetskläder ska tillhandahållas av arbetsgivaren, bytas dagligen och vid synlig nedsmutsning.
- Huvudduk ska bytas dagligen och vara instoppad innanför arbetsdräkten.
- Värmevästar kan användas av personal som inte arbetar patientnära. Byts med regelbundenhet några ggr/vecka och vid nedsmutsning.
- Tjockare jacka och byxa för utomhusbruk betraktas inte som "arbetskläder". Tvättas regelbundet och vid nedsmutsning. Ska inte cirkulera mellan olika personer utan att tvättas emellan.

Personal som vaccinerar

Tillämpa basala hygienrutiner, som innebär:

- Kortärmad arbetsdräkt, inga långärmade tröjor under eller ovanpå arbetsdräkten. T-shirt är tillåtet under arbetsdräkten.
- Inga klockor, smycken, förband eller stödskenor.
- Kortklippta naglar. Inget nagellack eller konstgjorda naglar.
- Uppsatt hår/skägg om det hänger ner i arbetsfältet.
- Desinfektion av händer och underarmar före och efter patientkontakt.

Munskydd IIR

- Munskydd behöver inte rengöras/bytas mellan varje patient förutsatt att man inte petar på munskyddet.
- Munskydd är en engångsprodukt och ska kastas efter användning.
- Vid raster ska munskydd kasseras (kastas).
- Samma munskydd kan användas i max fyra timmar, förutsatt att man inte vidrört munskyddet.
- I vissa situationer kan visir vara att föredra i stället för munskydd, till exempel vid samtal med personer med nedsatt hörsel.

Handskar (inkl. handhygien):

- Handskar ska bytas mellan varje patient och mellan olika vårdmoment.
- Händerna ska desinficeras före och efter användning av handskar.
- Handtvätt med tvål och vatten endast om man blivit synligt förorenad eller man känner sig smutsig.

Städ

- Tagytor ska rengöras flera gånger dagligen med ytdesinfektionsmedel. Om möjlighet finns ska rengöring utföras mellan varje patient.
- Patienttoaletternas tagytytor såsom handtag, kranar, spolknapp och toalettsits ska rengöras med ytdesinfektionsmedel flera gånger dagligen.
- Daglig städning av lokalerna enligt ordinarie rutin.

Dokumentet är utarbetat av: Maria Jonsson