

MRB-screening av patient i slutenvård och vid upprepade polikliniska sjukvårdande behandlingar på sjukhus

Exempel på poliklinisk sjukvårdande behandling på sjukhus är dialys, cytostatikabehandling, omfattande sårrevisorer/omläggningar.

Kategorier	Ska odlas	Odlas från	Placering	Provtagnings-anvisning	Riskfaktorer:
Patient som vårdats utanför Norden de senaste sex månaderna : <ul style="list-style-type: none"> • sjukhus/vårdhem/rehabilitering • annan institution, t.ex. barnhem poliklinisk sjukvårdande behandling (operationsingrepp inkl. tandvård, sårbehandling). 	MRB	-näsa -perineum -sår/hudskador -KAD-urin -svalg -faeces (pinnodling) -infarter och slangar	Enkelrum med egen toalett och dusch*	MRB	Riskfaktorer: <ul style="list-style-type: none"> • centrala infarter (CVK, picc-line och subkutan venport)** • diarré • drän och andra penetrerande slangar inkl. pyelostomi • hushållskontakt med MRSA • KAD/RIK** • omlägningskrävande sår • stomi • tatuering, nygjord • tracheostomi • utbredda eksem/fjällande hudsjukdom
Patient med riskfaktorer som vårdats på sjukhus i annan region i Sverige eller i Norden de senaste sex månaderna .					
Patient med riskfaktorer som varit bosatt utanför Norden de senaste två åren , inklusive "säsongboende" i annat land.					
Människor på flykt utan riskfaktorer					
Patient utan riskfaktorer som vårdats på vårdinrättning inom Norden med pågående smittspridning av specifik MRB. Aktuella riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) .	Riktad odling	MRSA – näsa, svalg, perineum VRE – faeces (pinnodling) ESBL, ESBL _{carba} – faeces (pinnodling)	Enkelrum med egen toalett och dusch*	MRB	Räknas inte som riskfaktor: <ul style="list-style-type: none"> • PVK • rena operationssår
Patient utan riskfaktorer som vårdats på sjukhus i annan region i Sverige eller i Norden de senaste sex månaderna .	Nej	Ingen odling	Kan samvårdas		
Patient utan riskfaktorer som varit bosatt utanför Norden de senaste två åren .	Nej	Ingen odling	Kan samvårdas		

Obs: Vid infekterat sår glöm inte allmän sårodling.

* tills preliminär svar föreligger

** endast i kombination med annan riskfaktor