

MRB-screening av patient i slutenvård och vid upprepade polikliniska sjukvårdande behandlingar på sjukhus

Exempel på poliklinisk sjukvårdande behandling på sjukhus är dialys, cytostatikabehandling, omfattande sårrevisorer/omläggningar.

Kategorier	Ska odlas	Odlas från	Placering	Provtagnings-anvisning	Riskfaktorer:
Patient som vårdats utanför Norden de senaste sex månaderna : <ul style="list-style-type: none"> • sjukhus/vårdhem/rehabilitering • annan institution, t.ex. barnhem poliklinisk sjukvårdande behandling (operationsingrepp inkl. tandvård, sårbehandling). 	MRB	-näsa -perineum -sår/hudskador -KAD-urin -svalg -faeces (pinnodling) -infarter och slangar	Enkelrum med egen toalett och dusch*	MRB	Riskfaktorer: <ul style="list-style-type: none"> • centrala infarter (CVK, picc-line och subkutan venport)** • diarré • drän och andra penetrerande slangar inkl. pyelostomi • hushållskontakt med MRSA • KAD/RIK** • omlägningskrävande sår • stomi • tatuering, nygjord • tracheostomi • utbredda eksem/fjällande hudsjukdom
Patient med riskfaktorer som vårdats på sjukhus i annan region i Sverige eller i Norden de senaste sex månaderna .					
Patient med riskfaktorer som varit bosatt utanför Norden de senaste två åren , inklusive "säsongboende" i annat land.					
Människor på flykt utan riskfaktorer					
Patient utan riskfaktorer som vårdats på vårdinrättning inom Norden med pågående smittspridning av specifik MRB. Aktuella riskområden för multiresistenta bakterier (MRB)	Riktad odling	MRSA – näsa, svalg, perineum VRE – faeces (pinnodling) ESBL, ESBL _{carba} – faeces (pinnodling)	Enkelrum med egen toalett och dusch*	MRB	Räknas inte som riskfaktor: <ul style="list-style-type: none"> • PVK • rena operationssår
Patient utan riskfaktorer som vårdats på sjukhus i annan region i Sverige eller i Norden de senaste sex månaderna .	Nej	Ingen odling	Kan samvårdas		
Patient utan riskfaktorer som varit bosatt utanför Norden de senaste två åren .	Nej	Ingen odling	Kan samvårdas		

Obs! Vid infekterat sår glöm inte allmän sårodling.

* tills preliminär svar föreligger

** endast i kombination med annan riskfaktor