

Lathund - patient med luftvägssymtom

- Följ basala hygienrutiner!
- Patient med misstänkt smittsam luftvägsinfektion ska inte dela rum, inte vistas i väntrum eller vänta/vårdas i korridor.

| | Skyddsutrustning | Placering | Övrigt |
|---|---|--|--|
| Misstanke om smittsam luftvägsinfektion | Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir | Enkelrum med egen toalett och stängd dörr. | Vid stark misstanke om influensa ges behandling till patient i riskgrupp i väntan på provsvar. Gäller även vaccinerade. |
| Kvarstående misstanke om smittsam luftvägsinfektion efter negativt provsvar för covid-19, influensa, RS | Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir | Enkelrum med egen toalett och stängd dörr. | Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (pdf) |
| Påvisad covid-19, influensa eller RS-virus | Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir | Enkelrum med egen toalett och stängd dörr. | Ta ställning till behandling. Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (pdf) |

* Ökad smittrisk

- Långvarig vistelse på vådrummet, exempelvis vid vak.
- Nära kontakt med individer med kraftig hosta.
- Nära kontakt med patientens luftväg (exempelvis bronkoskopi, intubation/extubation, trakeostomi, hjärt- lungräddning, inducerat sputum, hostmaskin, sugning av nedre luftvägar).
- Arbete hemma hos person med konstaterad covid-19 (exempelvis ordinärt boende, särskilt boende, LSS-boende).