

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 10	Antal sidor 2
Dokumentägare Monika Carlson Hygiensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2023-02-14	Giltig t.o.m. 2025-02-13

RS-virus - slutenvård, poliklinisk vård och dagvård

Gäller för: Hälso- och sjukvård



Tillämpa basala hygienrutiner

Sjukdom

Respiratory syncytialvirus (RS-virus) orsakar luftvägsinfektion av varierande allvarlighetsgrad. Det är främst små barn som kan drabbas av allvarlig lunginflammation och bronkiolit. Vuxna och äldre barn kan också drabbas och får oftast förkylningssymtom. Hos äldre och immunsupprimerade ses dock ibland allvarligare luftvägsinfektion.

Smittvägar

Smitta sprids via direkt och indirekt kontaktsmitta med patient eller via föremål och ytor. RS-virus sprids även som droppsmitta vid hosta och nysningar.

Aerosolsmitta förekommer men är ovanligt.

Smittsamhet

RS-virus är mycket smittsamt och har störst smittsamhet strax innan symptomdebut och tidigt i sjukdomsförloppet. Klart definierade kriterier för när en patient med RS kan anses ha låg smittsamhet finns inte. I normalfallet kan man utgå från, att låg smittsamhet föreligger vid stabil feberfrihet i minst 48 timmar utan febernedsättande läkemedel i kombination med minskande hosta. Hos små barn och immunsupprimerade kan smittsamheten kvarstå längre tid.

Placering

- Patient med RS-virus ska vårdas på enkelrum med egen toalett och stängd dörr.
- Patienten ska, om möjligt, inte vänta i korridor eller väntrum utan föras direkt in på undersökningsrum.
- Vid utbredd smittspridning och brist på enkelrum kan patienter med RS-virus samvårdas, det vill säga flera patienter med RS-virus kan vårdas i samma rum. Detta förutsätter att ingen annan smitta eller riskfaktorer för smittspridning föreligger.
- Patient med konstaterad RS-virus kan samvårdas med andra patienter (som inte har RS) när låg smittsamhet föreligger: stabil feberfrihet i 48 timmar utan febernedsättande läkemedel i kombination med minskande hosta.
- Små barn och immunsupprimerade patienter kan behöva vårdas på eget rum under längre tid än ovan angivet då smittsamheten kan kvarstå längre tid. Individuell bedömning behöver göras.
- Kan vårdas på Patienthotellet om förutsättningarna om patienten kan antas ha låg smittsamhet enligt kriterierna ovan.

Uppmana patient och anhöriga att desinfektera händerna innan måltid och efter toalettbesök.

Besök

Besökare till patient

- ska informeras om risken för smitta. Erbjud gärna skyddsutrustning.
- ska desinfektera händerna när de kommer och när de går.
- ska inte visa symtom på övre luftvägsinfektion. Undantag kan göras i särskilda fall som till exempel vid vård i livets slutskede (beslutas av ansvarig chef).

Utökade hygienrutiner

Använd **munskydd IIR och heltäckande visir/skyddsglasögon** vid omvårdnad eller undersökning av patient.

Använd **andningsskydd och heltäckande visir/skyddsglasögon** vid aerosolgenererade arbetsmoment.

Disk

Hanteras som vanligt disk.

Tvätt

Hanteras som vanlig tvätt.

Avfall

Hanteras som vanligt avfall.

Städning

Daglig städning och slutstädning: rengöringsmedel och vatten.

[Mer information om RS-virus på Smittskydd Värmlands webbplats](#)

Dokumentet är utarbetat av: Monika Carlson, Smittskydd Värmland