

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2013

Område: Strokesjukvård

Indikator: 104. Andel patienter med blodförtunnande behandling vid stroke 12-18 månader efter stroke och vid förmaksflimmer, 2010-2011 (ålder 55-79 år)

Kontaktperson: Johan Sanner Johan.Sanner@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Riksgenomsnitt: 71,5 procent (67,5 procent 2009-2010)

Värmland: 65,3 procent (60,8 procent 2009-2010)

I Värmland lägre än riksgenomsnittet, men en högre andel jämfört föregående mätning. De senaste 1-2 åren har problemet med underbehandling med antikoagulantia vid förmaksflimmer poängterats alltmer. Dessutom har det kommit nya antikoagulantia på marknaden och användningen av dessa ökar i Sverige.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Här kan vi bli ännu bättre genom att sprida informationen om vikten av antikoagulantiahandling. Primärvården har också en viktig roll när det gäller denna indikator. Vägar dit är bland annat:

Genom att skapa gemensamma dokument, samla strokedokument till en "Strokesida" kommer vi kunna nå ut bättre (se indikator 108).

Information via "Rekommenderade läkemedel", som Läkemedelskomitten i Värmland sammanställer.

Bättre uppföljning av riksstrokedata.

Genom delprojektet med Tum-EKG räknar vi med att finna fler patienter med förmaksflimmer som drabbats av stroke och behandla en större andel med effektiva antikoagulantia.