

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2013

Område: Strokesjukvård

Indikator: 105. Andel patienter med blodfettsänkande behandling 12-18 månader efter stroke(hjärninfarkt) 2010-2011

Kontaktperson: Johan Sanner Johan.Sanner@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Riksgenomsnitt: 72,0 procent

Värmland 72,5 procent

I Värmland totalt har vi en förskrivning kring riksgenomsnittet. Nivån ligger på ungefär samma nivå som vid föregående mätning. Tidigare har man också redovisat siffror på sjukhusnivå och här har det också funnits en del skillnader.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Här kan vi bli ännu bättre genom att sprida informationen om vikten av antikoagulantiahandling. Primärvården har också en viktig roll när det gäller denna indikator. Vägar dit är bland annat:

Genom att skapa gemensamma dokument, samla strokedokument till en "Strokesida" kommer vi kunna nå ut bättre (se indikator 108).

Information via "Rekommenderade läkemedel", som Läkemedelskomitten i Värmland sammanställer.

Bättre uppföljning av riksstrokedata.

Genom delprojektet med Tum-EKG räknar vi med att finna fler patienter med förmaksflimmer som drabbats av stroke och behandla en större andel med effektiva antikoagulantia.