

Förtydligande angående användningen av opioder till barn

Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC, har kommit med rekommendationer om begränsad användning av läkemedel som innehåller kodein till barn och vissa vuxna. Var god se [Läkemedelsverkets sammanfattning](#) samt terapigruppens [tidigare rekommendation 2013-10-21](#).

Rekommendation om adekvat analgetikaterapi till barn vid akut och postoperativ smärta framgår av Läkemedelsverkets skrift "[Information från Läkemedelsverket 3:2014](#)" vilken sammanfattat lyder:

Kodein och tramadol skall inte användas till barn och ungdomar under 18 år!

Terapigrupp Smärta rekommenderar följsamhet till läkemedelsverkets rekommendationer.

Med hänsyn till detta föreslås följande riktlinjer:

- Förstahandsvalet är peroralt morfin (tablett/mixtur)
 - till barn >3 mån: 0,15-0,25 mg/kg (max 10 mg/dos)
 - effekten/behov av ny dos kan tidigast bedömas efter 45-60 min
- Vid nedsatt njurfunktion kan peroralt oxikodon (tablett/kapsel/mixtur) övervägas
 - till barn >3 mån: 0,10-0,20 mg/kg (max 7,5 mg/dos)
 - effekten/behov av ny dos kan tidigast bedömas efter 45-60 min