

Asylsjuusköterskor
Barnmott: VC Gripen, VC Verkstaden,
VC Kristinehamn

IGRA-test Quantiferon på barn

I rutinen "Rekommenderade rutiner och provtagningar av asylsökande m.fl." från 2015-05-13 finns det när det gäller tuberkuloskontroll en uppdelning på barn över eller under 2 år.

Under rådande omständigheter med stor tillströmning av asylsökande och därmed många gånger svårigheter att följa upp PPD med återbesök och avläsning föreslår vi att man nu **i första hand tar IGRA-test på alla barn oavsett ålder.**

- Om man inte lyckas ta blodprov för IGRA är det viktigt att man tar ställning till att eventuellt göra ett nytt provtagningsförsök om det finns förutsättningar för det eller att man istället går vidare med ett PPD.
- Om man tar IGRA och får svar att det inte är bedömningsbart (indeterminant) så ska man sätta PPD.
- Om patienten har ett negativt IGRA så räcker det under nuvarande omständigheter som underlag för BCG vaccination.

Det är fortfarande så att det finns begränsat vetenskapligt underlag när det gäller IGRA och barn < 2 år men vi får alltmera erfarenhet att det fungerar tillfredsställande även på små barn.

Dock förekommer det, om än ovanligt, falskt negativa prov, vilket det också kan göra med PPD. Det betyder att om barnet har oklara symtom och det finns epidemiologi för tuberkulos ska man vara frikostig med lungröntgen och remiss till BUM alternativt att man ringer och konsulterar Tb-mottagningen. Ett negativt IGRA kan inte helt utesluta Tbc.

Vid positivt IGRA svar så gäller samma handläggningsrutin som tidigare.

Rutinen från 2015-05-13 kommer att revideras.

Med vänlig hälsning

Smittskydd Värmland

Ingemar Hallén
Smittskyddsläkare
